




Tabel reuzenjuffers, Pseudostigmatidae


Uit Suriname zijn momenteel zes soorten bekend.

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Algemeenheid	Collectie
Breedvleugel reuzenjuffer	<i>Microstigma anomalum</i>	Vrij algemeen	99
Tweestreek reuzenjuffer	<i>Mecistogaster linearis</i>	Vrij algemeen	69
Bultvleugel reuzenjuffer	<i>Mecistogaster lucretia</i>	Vrij algemeen	57
Citroentip reuzenjuffer	<i>Mecistogaster ornata</i>	Vrij zeldzaam	30
Kleine reuzenjuffer	<i>Mecistogaster jocaste</i>	Zeer zeldzaam	1
Kleinste reuzenjuffer	<i>Mecistogaster modesta</i>	Zeer zeldzaam	1


Surinaamse reuzenjuffers en hun voorkomen in de collectie in Leiden

<p>1 Vleugels relatief breed (meer dan 5x zo breed als lang). Grootte van de cellen aan de achterrand van de vleugel, kleiner dan die in de rest van de vleugel, min of meer vierkant van vorm. Breedvleugel reuzenjuffer <i>Microstigma anomalum</i> (naam was <i>M. maculatum</i>)</p>	<p>1' Vleugels relatief lang en smal (minder dan 7x zo breed als lang). Grootte van de cellen aan de achterrand van de vleugel van dezelfde grootte als de cellen in de rest van de vleugel, meeste langwerpig van vorm, dwars op de vleugelrichting. Alle zijn <i>Mecistogaster</i> soorten 2</p>
	
<p>2 Kleine soorten, achtervleugel lengte minder dan 47 mm. 3</p>	<p>2' Grottere soorten, achtervleugel lengte meer dan 49 mm. 4</p>
<p>3. Achtervleugel donkerder van kleur dan de voorvleugel. Zeer zeldzame soort uit ZW- Suriname. Coeroenie reuzenjuffer <i>Mecistogaster jocaste</i></p>	<p>3' Achtervleugel niet donkerder als de voorvleugel. Zeer zeldzame soort uit W-Suriname. Kleine reuzenjuffer <i>Mecistogaster modesta</i></p>
	


4 Mannetje vleugeltop achtervleugel vervormd, met aan de voorrandtop een uitstulping aan de vleugel. Vleugeltipvlekken vaak bruin-zwart echter soms ook wel wit, geel of oranje. Borststuk met uitroepteken: een kort stukje gevolgd door een lang stuk achter. Vrij algemeen. Bultvleugel reuzenjuffer
Mecistogaster lucretia



4' Mannetje vleugeltop achtervleugel zonder uitstulping. Borststuk zonder uitroepteken, antehumerale streep bestaat één streep of uit twee deels parallelle strepen. [5](#)



5 Borststuk bovenkant met één lange antehumerale streep. Vleugeltipvlekken meestal geel of oranje, soms tweekleurig bruin aan de onderzijde en oranje aan de bovenzijde. Aanhangsels mannetje licht met zwarte vlek nabij top. Vrij algemeen. Citroentip reuzenjuffer
Mecistogaster ornata



5' Borststuk bovenkant met twee antehumerale strepen die vrijwel even lang zijn maar alleen over de middelste helft van het borststuk langs elkaar lopen. Vleugeltipvlekken meestal donker, echter melkwit in jonge dieren, zelden geel. Aanhangsels mannetje zwart. Vrij algemeen. Tweestreep reuzenjuffer
Mecistogaster linearis

